



225 West Wacker Drive
Suite 400
Chicago, Illinois 60606
800.331.2020
PreventBlindness.org

Uveítis

Causas de la uveítis

La uveítis es un término para la inflamación del ojo. Puede ocurrir en un ojo o en ambos ojos y afecta la capa del ojo llamada uvea. También se puede asociar con la inflamación de otras partes del ojo y durar un tiempo corto (agudo) o largo (crónico). La uveítis puede ser grave y provocar una pérdida permanente de la visión. Por eso es importante diagnosticar y tratar la uveítis lo antes posible, idealmente antes de que se produzca un daño irreversible. La uveítis causa alrededor de 30.000 nuevos casos de ceguera cada año en los Estados Unidos.

Causas de la uveítis

Uveítis anterior

En más de un tercio de los casos de uveítis anterior, se desconoce la causa exacta, pero puede incluir:

- Espondiloartritis anquilosante
- Artritis reactiva
- Artropatía psoriásica
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Artritis idiopática juvenil (AIJ)
- Herpes
- Sarcoidosis
- Iridociclitis heterocrómica de Fuch
- Lupus
- Lente intraocular quirúrgicamente implantado para reemplazar un lente de cataratas
- Síndrome de Posner-Schlossman
- Artritis Reumatoide
- Sífilis
- Tuberculosis (TB)
- Enfermedad de Lyme

Uveítis intermedia

En más de dos tercios de todos los casos de uveítis intermedia, se desconoce la causa exacta. Se cree que el tercio restante de todos los casos se debe a afecciones como:

- Sarcoidosis
- Esclerosis múltiple (EM)
- Enfermedad de Lyme

Uveítis posterior

En más de uno de cada diez casos de uveítis posterior se desconoce la causa. La siguiente es una lista de causas comunes de uveítis posterior.

- Toxoplasmosis
- Retinitis por citomegalovirus (Retinitis por CMV)
- Lupus
- Retinocoroidopatía en forma de pájaro
- Sarcoidosis
- Necrosis retiniana aguda

Uveítis (continuado)



- Virus de Epstein-Barr (EBV)
- Enfermedad de Behcet
- Sífilis
- Placoides multifocales posteriores agudos epitelio-pigmentarios (APMPPE)
- Coroidopatía serpiginosa

Panuveítis

Como ocurre con otros tipos de uveítis, a menudo se desconoce la causa de la panuveítis. Otras causas posibles incluyen:

- Sarcoidosis
- Enfermedad de Behcet
- Lupus
- Sífilis
- Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada
- Tuberculosis (TB)
- Retinitis micótica

Uveítis en niños

A menudo, se desconoce la causa de la uveítis. La artritis idiopática juvenil (AIJ) es una de las causas principales de uveítis en los niños.

- Artritis idiopática juvenil (AIJ)
- Toxoplasmosis
- Toxocariasis
- Sarcoidosis
- Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada
- Necrosis retiniana aguda
- Artritis reactiva
- Lupus
- Enfermedad de Behcet
- Iridociclitis heterocrómica de Fuchs
- Varicela

Recursos para el cuidado ocular

Prevent Blindness tiene una lista de recursos de asistencia financiera para aquellos que necesitan apoyo en satisfacer sus necesidades de salud ocular y medicamentos. Visita: www.preventblindness.org/vision-care-financial-assistance-information.

Para obtener más información sobre la uveítis, visite www.preventblindness.org/uveitis, o llame al 1-800-331-2020.